

イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg 「ハンルイ」 イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg 「ハンルイ」 投与時のチェックシート

※カルテ等に貼付してご活用ください

投与予定日(投与前24時間以内)に末梢血液検査を必ず実施してください。

投与禁忌 (次の患者には投与しないこと)

該当する場合は、本剤の投与を中止又は延期してください。

- 骨髄機能抑制のある患者
 - 白血球数が3,000/mm³未満 (白血球数: /mm³)
 - 血小板数が10万/mm³未満 (血小板数: 万/mm³)
 - 白血球数又は血小板数の急激な減少傾向あり
- 感染症を合併している患者
(発熱やCRPの異常高値にもご留意ください)
- 下痢(水様便)のある患者
- 腸管麻痺、腸閉塞のある患者
- 間質性肺炎又は肺線維症の患者
- 多量の腹水、胸水のある患者
- 黄疸のある患者 (総ビリルビン値: mg/dL)
- アタザナビル硫酸塩を投与中の患者
- 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

慎重投与 (次の患者には慎重に投与すること)

- 肝障害のある患者
- 腎障害のある患者
- 糖尿病の患者
- 全身衰弱が著しい患者
- 高齢者
- 小児